



Attitudes et comportements relatifs à la sexualité

Adolescents et mères du Canada

Association Canadienne pour la Santé des Adolescents



Canadian Association for Adolescent Health

Objectifs de l'étude

- Colliger des données sur les attitudes et les comportements des adolescents en ce qui concerne la sexualité et la santé sexuelle.
- Évaluer la perception des mères quant aux attitudes et comportements de leurs adolescents en ce qui concerne la sexualité et la santé sexuelle.
- Évaluer les perceptions des adolescents et de leurs mères quant aux infections transmissibles sexuellement.
- Connaître les sources qu'utilisent les adolescents et leurs mères pour trouver des renseignements sur la sexualité et la santé sexuelle.
- Cerner les lacunes en matière d'information sur la sexualité et la santé sexuelle et les obstacles à franchir pour obtenir ce type d'information.
- Évaluer les perceptions de la communication portant sur la sexualité et la santé sexuelle entre des parents et adolescents.





Un grand nombre d'adolescents canadiens adoptent des comportements sexuels qui constituent une menace pour leur santé.


Association Canadienne pour la Santé des Adolescents




Canadian Association for Adolescent Health

Situation des adolescents au regard de l'activité sexuelle


	Total (n=1171)	14 ans (n=262)	15 ans (n=298)	16 ans (n=314)	17 ans (n=297)
Pas sexuellement actifs/actives (chiffres nets)	73 %	93 %	80 %	66 %	55 %
Je ne suis pas encore sexuellement actif/active	57 %	79 %	65 %	48 %	40 %
Je ne suis pas encore sexuellement actif/active, mais je crois que je pourrais l'être d'ici un an	16 %	14 %	15 %	18 %	15 %
Sexuellement actifs/actives (chiffres nets)	27 %	7 %	20 %	34 %	45 %
Je suis actuellement sexuellement actif/active	15 %	3 %	10 %	19 %	27 %
Je ne suis pas actuellement sexuellement actif/active, mais je l'ai été par le passé	12 %	4 %	10 %	15 %	18 %




Nombre de partenaires sexuels depuis la première relation sexuelle



Activités sexuelles « occasionnelles »




Jeunes dont le partenaire a/a eu d'autres partenaires sexuels



Méthode de contraception utilisée lors des dernières relations sexuelles — par tranche d'âge


	Total (n=319)	14 ans (n=19)	15 ans (n=59)	16 ans (n=108)	17 ans (n=133)
Condom	76 %	79 %	80 %	79 %	72 %
Condom sans contraceptifs oraux	53 %	59 %	55 %	55 %	51 %
Contraceptifs oraux (anovulants)	33 %	31 %	33 %	32 %	35 %
Retrait — Aucun des moyens indiqués ci-dessus (chiffres nets)	19 %	16 %	17 %	23 %	17 %
- Aucun des moyens indiqués ci-dessus	10 %	11 %	12 %	11 %	9 %
- Retrait	9 %	5 %	5 %	12 %	8 %
Autres méthodes contraceptives (timbre, injection, bague, dispositif intra-utérin, crème spermicide)	4 %	10 %	3 %	5 %	1 %
Contraceptif d'urgence (pilule du lendemain)	1 %	5 %	-	1 %	1 %

Vérification du condom après usage




Activités pratiquées depuis les premières relations sexuelles

	Total (n=319)	Hommes (n=147)	Femmes (n=172)	C.-B. (n=43)	Prairies (n=37)	Ontario (n=115)	Québec (n=105)	Atlantique (n=19)
Embrasser la bouche ouverte avec la langue/"french kiss "	90 %	88 %	91 %	88 %	95 %	90 %	88 %	94 %
Rapport vaginal	85 %	80 %	89 %	77 %	87 %	84 %	90 %	85 %
Toucher les parties génitales	76 %	73 %	79 %	67 %	87 %	71 %	83 %	75 %
Toucher ou embrasser les seins ou les mamelons	70 %	78 %	62 %	63 %	87 %	66 %	68 %	88 %
Relations buccogénitales	68 %	67 %	68 %	56 %	87 %	68 %	68 %	63 %
Masturber quelqu'un ou se faire masturber	58 %	54 %	61 %	53 %	54 %	56 %	64 %	62 %
Se masturber en présence de quelqu'un	25 %	25 %	25 %	28 %	22 %	25 %	26 %	22 %
Se masturber en étant en contact avec quelqu'un au téléphone ou par Internet	17 %	18 %	16 %	19 %	19 %	17 %	13 %	25 %
Rapport anal	9 %	8 %	11 %	12 %	8 %	9 %	10 %	9 %



Âge des premières relations sexuelles ou relations buccogénitales




Âge moyen des premières relations sexuelles et relations buccogénitales : 15 ans




Attitudes envers les relations buccogénitales

— Deux premiers rangs
(Tout à fait d'accord ou assez d'accord)




Perceptions relatives à la fréquence des ITS

Deux premiers rangs (Très courante et assez courante)



Conséquences possibles du virus du papillome humain (VPH)






Les adolescents canadiens doivent surmonter d'importants obstacles pour trouver des renseignements sur les ITS et sur les autres questions relatives à la santé sexuelle.

Association Canadienne pour la Santé des Adolescents




Canadian Association for Adolescent Health


Obstacles à surmonter pour obtenir de l'information sur la sexualité et la santé sexuelle




Utilité des programmes d'éducation sexuelle à l'école



Définition des rapports sexuels



Définition de l'abstinence sexuelle






Les parents sous-estiment l'importance qu'ils ont aux yeux de leurs adolescents et le rôle que ceux-ci voudraient les voir jouer dans le domaine de la sexualité et de la santé sexuelle.

Association Canadienne pour la Santé des Adolescents




Canadian Association for Adolescent Health

Modèles des adolescents en matière de sexualité



Sources d'information des adolescents sur la sexualité et la santé sexuelle



Sources d'information les plus utiles et les plus fiables en matière de sexualité et de santé sexuelle

